



INFLUVAC® - Vacina influenza trivalente (inativada, subunitária) MS: 1.0553.0336. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES. VIA INTRAMUSCULAR (PREFERENCIAL) OU SUBCUTÂNEA PROFUNDA (ALTERNATIVA). CEPAS 2017: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); B/ Brisbane/60/2008. INDICAÇÕES: Prevenção da gripe (*influenza*) para crianças (>6 meses), adolescentes e adultos, sem limite de idade.

CONTRAINDICAÇÕES: menores de 6 meses de idade, hipersensibilidade conhecida às substâncias ativas, a qualquer um dos excipientes, ao ovo, proteína de galinha, formaldeído, brometo de cetiltrimetilamônio, polissorbato 80 ou gentamicina. Adiar imunização em pacientes com febre ou infecção aguda. Este medicamento é contraindicado para menores de 6 meses de idade.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Não administrar por via intravenosa. Administrar preferencialmente por via intramuscular ou por via subcutânea profunda. O tratamento médico apropriado devem estar prontamente disponíveis em caso de um evento anafilático. Reações relacionadas com ansiedade podem ocorrer. **Gravidez ou lactação:** pode ser utilizada em todos os estágios da gravidez e pode ser usada durante a amamentação. **Categoria de risco na gravidez:** C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. **POSOLOGIA:** Adultos e crianças a partir de 36 meses: **0,5 mL**. Crianças de 6 a 35 meses: **0,25 mL**. **Para crianças 6 meses a 8 anos que ainda não tenham sido previamente vacinadas:** uma segunda dose deverá ser administrada após um intervalo de pelo menos 4 semanas. **Para adultos e crianças a partir de 9 anos de idade:** é necessária apenas uma dose de 0,5 mL. **Modo de usar:** Esta vacina deve ser mantida entre +2°C e +8°C e administrada em temperatura ambiente. Não deve ser congelada. Proteger da luz. Para as apresentações com seringa preenchida sem agulha, remover o batoque ou tampa da seringa e acoplar a agulha apenas no momento da administração, nunca antes disso. Higienizar adequadamente as mãos antes e sempre que realizar este procedimento. **A vacina influenza não deve ser misturada com outra vacina na mesma seringa. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** a vacina influenza pode ser administrada simultaneamente a outras vacinas porém em membros distintos e com seringas e agulhas diferentes. **REAÇÕES ADVERSAS:** cefaleia*; distúrbios da pele e tecido subcutâneo: sudorese*; distúrbios músculo-esquelético e do tecido conectivo: mialgia e artralgia*; distúrbios gerais e no local de administração febre, mal estar, calafrio, fadiga, eritema, edema, dor, equimose e endureção. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.** Registrado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Rua Michigan, 735 - São Paulo – SP. CNPJ 56.998.701/0001-16. ABBOTT CENTER: 0800 703 1050. (BU 28). **(ATENÇÃO: A BULA DE INFLUVAC É ATUALIZADA ANUALMENTE. CERTIFIQUE-SE SEMPRE SE ESTÁ É A BULA MAIS ATUAL)**

Data da impressão da peça publicitária